18 CONGRESO NACIONAL DE ORTOPEDIA PEDIÁTRICA
3 al 5 de junio - 2026 BARCELONA

Organiza:
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORTOPEDIA PEDIÁTRICA
SEOP



PIE CAVOVARO COMO SECUELA DE SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

Espinazo Arce, O; Peña Arantzibia, H; López Serna, L.
S. Ortopedia Infantil del Servicio de COT
OSI Bilbao-Basurto

- Varón de 14 años y 8 meses.
- 11 meses de evolución de síndrome de Guillain-Barré subtipo AMAN.
- Remitido desde Rehabilitación por pie equinocavovaro derecho progresivo.
- BM:
  - Tríceps 4/5
  - Tibial posterior 4/5
  - Tibial anterior 2/5
  - Peroneos 2/5







Aspecto radiológico





Intervenido en mayo-25 del pie derecho:

- ✓ Liberación de partes blandas mediales
- ✓ Fasciotomia plantar
- ✓ OT de 1º MT y 1ª cuña
- ✓ Transposición de peroneo largo a corto
- ✓ Transposición de tibial posterior a 3ª cuña
- ✓ Elongación de Aquiles

En la evolución, se evidencia progresión de la misma deformidad en el pie izquierdo









Intervenido en noviembre-25
(mismo procedimiento)









CONCLUSIÓN:
La fase de recuperación del síndrome de Guillain-Barré puede ser incompleta, dejando secuelas a largo plazo.